



Palette végétale

Haute-Garonne

Planter local

Pourquoi ?

- Favoriser les **interactions** entre la flore indigène et les pollinisateurs
- **Limiter** l'introduction d'espèces exotiques envahissantes
- Contribuer aux **continuités écologiques** pour maintenir les trames vertes et bleues (TVB)
- Favoriser la **résilience** des écosystèmes
- Atténuer les effets du **changement climatique** (îlots de chaleur)
- **Diversifier** les cortèges floristiques en milieu urbain

Comment ?

La marque **Végétal local** (<https://www.vegetal-local.fr/>) assure une provenance locale de végétaux indigènes, une prise compte de la diversité génétique des plantes ainsi qu'une conservation des ressources qui sont récupérées en milieu naturel.

Cette palette se base sur la liste d'espèces dont la répartition biogéographique correspond à celle du **Sud-Ouest** dont la Haute-Garonne fait partie.



Sommaire

Milieu boisé – Strates arboré et arbustive.....	p.1
Milieu boisé – Strate herbacée.....	p.2
Milieu ouvert – Haie champêtre.....	p.3
Milieu ouvert – Les prairies.....	p.4
Milieu ouvert – Les gazons.....	p.5
Milieu ouvert – Les parterres.....	p.6
Milieu rocailleux.....	p.7
Milieu humide – Strates arboré et arbustive.....	p.8
Milieu humide – Strate herbacée.....	p.9
Bibliographie.....	p.10

Conseils généraux

- **Valoriser** et **préserver** la flore spontanée que l'on peut déjà observer avant de semer. Cette dernière n'inclut aucun coût financier ! Par exemple, il peut être intéressant de laisser la flore s'installer sur les terrepleins, les fossés ou encore les bords de chemins.
- Réaliser avant tout ensemencement ou plantation une **étude sur la composition des sols et les conditions du milieu** (humidité, luminosité...) afin d'installer les espèces végétales les mieux adaptées au substrat.
- **Essayer de relier** les espaces végétalisés dans les milieux urbanisés afin de contribuer à une biodiversité plus importante sur le territoire.
- **Eviter** les plantes toxiques, allergisantes ou présentant des caractéristiques anatomiques comme des aiguillons ou des épines dans les endroits fréquentés par des enfants.
- **Sensibiliser** les agents techniques à la biodiversité, en expliquant comment et pourquoi il est essentiel de sauvegarder ce patrimoine naturel. En application, un calendrier de taille ou de fauche peut être mis en place.

Milieu boisé

Strates arborée et arbustive

Nom latin	Nom vernaculaire	Floraison	pH du sol	Couleur fleur	Lumière	Température	Humidité du sol
<i>Arbutus unedo</i>	Arbousier commun	10-1	A	Blanc	2	3	2
<i>Ilex aquifolium</i>	Houx	5-6	A	Blanc	2	2	3
<i>Quercus suber</i>	Chêne liège	4-5	A	Jaune	1	3	2
<i>Acer campestre</i>	Erable champêtre	4-5	N	Vert	1	2	3
<i>Acer monspessulanum</i>	Erable de Montpellier	5	N	Jaune	1	3	2
<i>Carpinus betulus</i>	Charme commun	4-5	N	Jaune	1	2	3
<i>Clematis vitalba</i>	Clématite des haies	6-8	N	Blanc	2	2	3
<i>Corylus avellana</i>	Noisetier	1-3	N	Jaune	2	2	3
<i>Pinus sylvestris</i>	Pin sylvestre	5-6	N	-	1	1	3
<i>Prunus avium</i>	Cerisier des bois	4-5	N	Blanc	1	2	3
<i>Quercus petraea</i>	Chêne sessile	3-5	N	Jaune	2	2	3
<i>Quercus pubescens</i>	Chêne pubescent	4-5	N	Jaune	1	3	2
<i>Quercus robur</i>	Chêne pédonculé	4-5	N	Jaune	1	2	3
<i>Sorbus torminalis</i>	Alisier torminal	5	N	Blanc	1	2	3
<i>Tilia platyphyllos</i>	Tilleul à grandes feuilles	6-7	N	Blanc	2	3	3
<i>Ulmus minor</i>	Orme champêtre	3-4	N	Rose	1	2	3
<i>Cornus mas</i>	Cornouiller sauvage	3	B	Jaune	1	3	3
<i>Ligustrum vulgare</i>	Troène	5-7	B	Blanc	2	2	2
<i>Prunus malaheba</i>	Cerisier de Sainte-Lucie	4-5	B	Blanc	1	2	2
<i>Viburnum lantana</i>	Viorne lantane	4-5	B	Blanc	1	2	2
<i>Crataegus germanica</i>	Néflier	5	A	Blanc	2	2	3
<i>Cytisus scoparius</i>	Genêt à balais	4-7	A	Jaune	1	2	3
<i>Erica scoparia</i>	Bruyère à balais	5-7	A	Blanc	1	3	2
<i>Lonicera periclymenum</i>	Chèvrefeuille des bois	6-9	A	Blanc	2	2	3
<i>Ulex europaeus</i>	Ajonc d'Europe	2-6	A	Jaune	1	2	2
<i>Cornus sanguinea</i>	Cornouiller sanguin	5-6	N	Blanc	2	2	3
<i>Crataegus monogyna</i>	Aubépine monogyne	4-9	N	Blanc	1	2	3
<i>Euonymus europaeus</i>	Fusain d'Europe	4-5	N	Blanc	2	2	3
<i>Juniperus communis</i>	Génévrier commun	4-5	N	Jaune-Vert	1	2	2
<i>Prunus spinosa</i>	Prunellier épine noire	4	N	Blanc	1	2	3
<i>Sambucus nigra</i>	Sureau noir	5-7	N	Blanc	2	2	3



Chêne pédonculé



Charme commun



Erable champêtre



Alisier torminal



Fusain d'Europe



Troène


Conseils

Les essences de feuillus sont les mieux adaptées à notre climat. Les feuilles permettent de conserver la fraîcheur tandis qu'après leur chute, le sol peut être réchauffé par les rayons du soleil.

Les bosquets ou petits bois composés d'arbustes, d'arbrisseaux et d'arbres sont de véritables refuges pour la faune. Il est essentiel de séparer les plants utilisés de 2,5 à 3 m. La dynamique herbacée de ce milieu va s'enrichir avec le temps avec des mousses, champignons, fougères...

Les alignements d'arbres permettent la nidification d'espèces, servent de refuge et de ressource alimentaire et participent à la cohérence de la TVB. Il est important de diversifier les essences au sein d'un même alignement pour limiter la propagation de maladies et de parasites.

Légende



Milieu boisé

Strate herbacée

Nom latin	Nom vernaculaire	Floraison	pH du sol	Couleur fleur	Lumière	Température	Humidité du sol
<i>Ajuga reptans</i>	Bugle rampante	4-8	N	Violet	2	2	3
<i>Alliaria petiolata</i>	Alliaire	4-6	N	Blanc	2	2	3
<i>Anemone nemorosa</i>	Anémone des bois	3-5	N	Blanc	2	2	3
<i>Angelica sylvestris</i>	Angélique sauvage	7-9	N	Blanc	2	2	4
<i>Aquilegia vulgaris</i>	Ancolie vulgaire	5-7	N	Violet	2	2	3
<i>Arum italicum</i>	Pied-de-Veau	4-5	N	Blanc	2	2	3
<i>Brachypodium sylvaticum</i>	Brachypode des bois	6-9	N	Vert	2	2	3
<i>Buglossoides purpureoacerulea</i>	Grémil pourpre bleu	4-6	B	Bleu	2	3	2
<i>Carex flacca</i>	Laïche glauque	4-6	B	Noir	3	2	3
<i>Carex sylvatica</i>	Laïche des bois	5-7	N	Vert	2	2	3
<i>Chaerophyllum hirsutum</i>	Cerfeuil hérissé	6-8	N	Blanc	3	1	4
<i>Digitalis lutea</i>	Digitale jaune	6-9	N	Jaune	2	2	3
<i>Fragaria vesca</i>	Fraisier des bois	4-6	N	Blanc	2	2	3
<i>Geranium robertianum</i>	Géranium herbe à Robert	4-9	N	Rose	2	2	3
<i>Geum urbanum</i>	Benoîte urbaine	5-9	N	Jaune	2	2	3
<i>Glechoma hederacea</i>	Lierre terrestre	3-5	N	Violet	2	2	3
<i>Primula veris</i>	Primevère officinale	3-5	B	Jaune	3	2	2
<i>Pulmonaria affinis</i>	Pulmonaire affine	4-5	A	Bleu	2	2	3
<i>Ruscus aculaetus</i>	Fragon	9-4	A	Vert	2	3	2
<i>Sambucus ebulus</i>	Sureau yèble	6-8	B	Blanc	3	2	3
<i>Stachys recta</i>	Epiaire droite	6-9	B	Blanc	3	2	2
<i>Stellaria holostea</i>	Stellaire holostée	4-6	A	Blanc	2	2	3
<i>Vicia sepium</i>	Vesce des haies	5-9	N	Violet	2	2	3
<i>Viola hirta</i>	Violette hérissée	3-5	B	Violet	2	2	2
<i>Viola odorata</i>	Violette odorante	3-5	N	Violet	2	2	3
<i>Viola reichenbachiana</i>	Violette des bois	4-5	N	Violet	2	2	3



Stellaire holostée



Grémil pourpre bleu



Bugle rampante



Géranium Herbe à Robert



Alliaire




Lierre terrestre

Conseils

Cette palette peut être utilisée pour accompagner le **développement de la strate herbacée** d'un petit bois mais elle peut également servir dans des milieux qui demandent **peu de lumière**.

Légende



Milieu ouvert

Haie champêtre

Nom latin	Nom vernaculaire	Floraison	pH du sol	Couleur fleur	Lumière	Température	Humidité du sol
<i>Cytisus scoparius</i>	Genêt à balais	4-7	A	Jaune	1	2	3
<i>Erica cinerea</i>	Bruyère cendrée	6-9	A	Rose	3	2	2
<i>Lonicer periclymenum</i>	Chèvrefeuille des bois	6-9	A	Blanc	2	2	3
<i>Malus sylvestris</i>	Pommier sauvage	4-5	A	Blanc	2	2	3
<i>Populus tremula</i>	Peuplier tremble	3-4	A	Vert	3	2	3
<i>Pyrus communis subsp pyrastrer</i>	Poirier sauvage	4-5	A	Blanc	2	2	3
<i>Pyrus cordata</i>	Poirier à feuilles en cœur	4	A	Blanc	2	2	2
<i>Ulex europaeus</i>	Ajonc d'Europe	2-6	A	Jaune	1	2	2
<i>Buxus sempervirens</i>	Buis commun	3-4	B	Jaune	2	3	2
<i>Ligustrum vulgare</i>	Troëne	5-7	B	Blanc	2	2	2
<i>Prunus malaheb</i>	Cerisier de Sainte-Lucie	4-5	B	Blanc	1	2	2
<i>Viburnum lantana</i>	Viorne lantane	4-5	B	Blanc	1	2	2
<i>Acer campestre</i>	Erable champêtre	4-5	N	Vert	1	2	3
<i>Carpinus betulus</i>	Charme commun	4-5	N	Jaune	1	2	3
<i>Clematis vitalba</i>	Clématite des haies	6-8	N	Blanc	2	2	3
<i>Cornus sanguinea</i>	Cornouiller sanguin	5-6	N	Blanc	2	2	3
<i>Crataegus monogyna</i>	Aubépine monogyne	4-9	N	Blanc	1	2	3
<i>Euonymus europaeus</i>	Fusain d'Europe	4-5	N	Blanc	2	2	3
<i>Juniperus communis</i>	Génévrier commun	4-5	N	-	1	2	2
<i>Prunus avium</i>	Cerisier des bois	4-5	N	Blanc	1	2	3
<i>Prunus spinosa</i>	Prunellier épine noire	4	N	Blanc	1	2	3
<i>Quercus pubescens</i>	Chêne pubescent	4-5	N	Jaune	1	3	2
<i>Quercus robur</i>	Chêne pédonculé	4-5	N	Jaune	1	2	3
<i>Rhamnus alaternus</i>	Nerprun alterne	3-4	N	Jaune	3	3	2
<i>Rosa canina</i>	Eglantier des chiens	5-7	N	Rose	3	2	2
<i>Rosa sempervirens</i>	Rosier toujours vert	5-6	N	Blanc	3	2	3
<i>Sambucus nigra</i>	Sureau noir	5-7	N	Blanc	2	2	3
<i>Tilia platyphyllos</i>	Tilleul à grandes feuilles	6-7	N	Blanc	2	3	3
<i>Ulmus minor</i>	Orme champêtre	3-4	N	Rose	1	2	3



Ajonc d'Europe




Viorne lantane



Cornouiller sanguin



Aubépine monogyne



Prunellier épine noire



Eglantier des chiens

Conseils


Les haies champêtres présentent de nombreux avantages pour la faune en servant de lieu de reproduction, d'abri et de source de nourriture. Elles apportent d'autres intérêts comme l'adaptation aux conditions climatiques, la protection contre le vent ou la réduction du ruissellement.

L'élaboration d'une haie consiste à planter les essences **sur deux rangs en quinconce espacés d'un mètre**. La **libre évolution** des essences utilisées permettra d'offrir une floraison et une fructification abondante et diversifiée.

Réaliser un **paillage organique** au pied de la haie permettra de conserver l'humidité du sol. Le taillage de la haie s'effectue entre **fin août et décembre** afin d'éviter la période de nidification.

L'entretien peut consister à **élaguer** quelques branches pour réduire le volume de la haie tout en conservant le port de l'arbre.

Légende



Milieu ouvert

Les prairies



Achillée millefeuille



Sauge des prés



Brize intermédiaire



Bleuet des moissons



Vipérine commune



Oenanthe faux-boucage

Conseils


Le site choisi pour le **développement d'une prairie** doit être ensoleillé, protégé des vents dominants et du piétinement, le sol doit être pauvre en matière organique. Un excès de nutriment favorisera les graminées au préjudice des autres espèces.

Privilégiez une **fauche tardive** à la fin de l'été ou de l'automne pour que les espèces réalisent en entier leur cycle de vie. Après que les résidus de fauche soient restés sur place pendant quelques jours, **exportez-les** pour ne pas enrichir le sol. Vous pouvez les réutiliser pour le paillage ou le compostage. La **fauche annuelle** n'est pas obligatoire mais il est essentiel de la maintenir au moins tous les 2 ou 3 ans afin d'éviter la fermeture du milieu.

Pour les prairies où la **diversité floristique est faible**, un réensemencement permettra d'améliorer la richesse spécifique.

Nom latin	Nom vernaculaire	Floraison	pH du sol	Couleur fleur	Lumière	Température	Humidité du sol
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Flouve odorante	4-6	A	Jaune	3	2	3
<i>Cyanus segetum</i>	Bleuet des moissons	5-7	A	Bleu	3	2	3
<i>Holcus lanatus</i>	Houlque laineuse	5-8	A	Rose	3	2	3
<i>Agrimonia eupatoria</i>	Aigremoine commune	6-9	B	Jaune	2	2	2
<i>Bromopsis erecta</i>	Brome érigé	5-7	B	Vert	3	2	2
<i>Cichorium intybus</i>	Chicorée amère	7-9	B	Bleu	3	2	3
<i>Lathyrus latifolius</i>	Gesse à larges feuilles	6-8	B	Rose	2	3	2
<i>Salvia pratensis</i>	Sauge des prés	5-7	B	Violet	3	3	2
<i>Achillea millefolium</i>	Achillée millefeuille	6-9	N	Blanc	3	2	3
<i>Briza media</i>	Brize intermédiaire	5-7	N	Rose	3	2	2
<i>Bromus hordeaceus</i>	Brome mou	4-7	N	Vert	3	2	2
<i>Centaurea jacea</i>	Centaurée jacée	6-9	N	Rose	3	2	3
<i>Dactylis glomerata</i>	Pied-de-poule	4-9	N	Vert	3	2	3
<i>Daucus carota</i>	Carotte sauvage	5-10	N	Blanc	3	2	3
<i>Dipsacus fullonum</i>	Cabaret des oiseaux	7-9	N	Rose	3	2	3
<i>Echium vulgare</i>	Vipérine commune	5-8	N	Bleu	3	2	2
<i>Galium mollugo</i>	Gaillet commun	6-8	N	Blanc	3	2	3
<i>Hypericum perforatum</i>	Millepertuis perforé	6-9	N	Jaune	3	2	3
<i>Knautia arvensis</i>	Knautie des champs	6-8	N	Rose	3	2	2
<i>Lathyrus pratensis</i>	Gesse des prés	5-8	N	Jaune	2	2	3
<i>Leucanthemum vulgare</i>	Marguerite commune	5-8	N	Blanc	3	2	3
<i>Linum usitatissimum subsp. angustifolium</i>	Lin bisannuel	5-7	N	Bleu	3	3	3
<i>Malva moschata</i>	Mauve musquée	6-9	N	Rose	3	2	3
<i>Muscari comosum</i>	Muscari à toupet	4-6	N	Violet	3	3	2
<i>Oenanthe pimpinelloides</i>	Oenanthe faux-boucage	6-7	N	Blanc	3	3	3
<i>Origanum vulgare</i>	Origan commun	7-9	N	Rose	2	2	3
<i>Papaver rhoeas</i>	Coquelicot	5-7	N	Rouge	3	2	2
<i>Poa trivialis</i>	Pâturin commun	4-7	N	Vert	2	2	3
<i>Ranunculus acris</i>	Bouton d'or	5-9	N	Jaune	3	2	3
<i>Rumex acetosa</i>	Oseille des prés	5-9	N	Rouge	3	2	3
<i>Scabiosa columbaria</i>	Scabieuse colombarie	6-10	N	Rose	3	2	2
<i>Trifolium pratense</i>	Trèfle des prés	5-9	N	Rose	3	2	3
<i>Verbascum thapsus</i>	Molène bouillon-blanc	6-11	N	Jaune	3	2	2
<i>Vicia cracca</i>	Jarosse	6-8	N	Violet	2	2	3

Légende



Milieu ouvert

Les gazons

Nom latin	Nom vernaculaire	Floraison	pH du sol	Couleur fleur	Lumière	Température	Humidité du sol
<i>Achillea millefolium</i>	Achillée millefeuille	6-9	N	Blanc	3	2	3
<i>Anthyllis vulneraria</i>	Anthyllide vulnéraire	5-8	N	Jaune	3	2	2
<i>Bellis perennis</i>	Pâquerette	3-11	N	Blanc	3	2	3
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Capselle bourse-à-pasteur	3-12	N	Blanc	3	2	3
<i>Centaureum erythraea</i>	Petite centaurée commune	6-9	N	Rose	3	2	3
<i>Crepis capillaris</i>	Crépide capillaire	6-9	N	Jaune	3	2	2
<i>Lolium perenne</i>	lvràie vivace	5-10	N	Vert	3	2	3
<i>Lotus corniculatus</i>	Lotier corniculé	5-9	N	Jaune	3	2	2
<i>Muscari neglectum</i>	Muscari à grappes	3-5	N	Violet	3	3	2
<i>Myosotis arvensis</i>	Myosotis des champs	4-9	N	Bleu	2	2	3
<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé	4-10	N	Blanc	3	2	3
<i>Poa trivialis</i>	Pâturin commun	4-7	N	Vert	2	2	4
<i>Potentilla reptans</i>	Potentille rampante	6-10	N	Jaune	3	2	3
<i>Prunella vulgaris</i>	Brunelle commune	6-9	N	Violet	2	2	3
<i>Trifolium fragiferum</i>	Trèfle porte-fraises	6-9	N	Rose	3	3	4
<i>Trifolium pratense</i>	Trèfle des prés	5-9	N	Rose	3	2	3
<i>Trifolium repens</i>	Trèfle rampant	5-10	N	Blanc	3	2	3
<i>Veronica chamaedrys</i>	Véronique petit-chêne	4-6	N	Bleu	2	2	3
<i>Viola odorata</i>	Violette odorante	3-5	N	Violet	2	2	3



Lotier corniculé



Trèfle des prés



Véronique petit-chêne



Petite centaurée commune



Brunelle commune



Trèfle porte-fraises


Conseils

Le gazon peut être une structure paysagère intéressante. Pour cela, il suffit de réaliser une hauteur de végétation un peu plus élevée en formant des courbes ou des lignes entre différents espaces. On appelle cette méthode la **fauche différenciée**.

Réaliser une **coupe haute** du gazon à 6-8 cm présente plusieurs avantages : économiser plusieurs tontes, rendre le gazon plus résistant à la sécheresse, avoir un meilleur développement racinaire, limiter le développement de mousses et surtout favoriser d'autres plantes comme le trèfle.

La qualité et la santé du sol ne sera que meilleure en mettant en place cette préconisation de gestion.

Légende



Milieu ouvert

Les parterres

Nom latin	Nom vernaculaire	Floraison	pH du sol	Couleur fleur	Lumière	Température	Humidité du sol
<i>Calluna vulgaris</i>	Callune	7-10	A	Rose	2	2	3
<i>Dianthus armeria</i>	Œillet armerie	6-8	A	Rose	3	3	2
<i>Matricaria chamomilla</i>	Matricaire Camomille	5-9	A	Blanc	3	2	3
<i>Agrimonia eupatoria</i>	Aigremoine commune	6-9	B	Jaune	2	2	2
<i>Centaurea scabiosa</i>	Centaurée scabieuse	7-8	B	Rose	3	2	2
<i>Galactites tomentosus</i>	Chardon laiteux	5-8	B	Rose	3	3	1
<i>Geranium sanguineum</i>	Géranium sanguin	6-7	B	Rose	2	2	2
<i>Legousia speculum-veneris</i>	Miroir de Vénus	5-7	B	Bleu	3	3	2
<i>Ononis striata</i>	Bugrane striée	6-8	B	Jaune	3	2	2
<i>Salvia pratensis</i>	Sauge des prés	5-7	B	Violet	3	3	2
<i>Stachys recta</i>	Epiaire droite	6-9	B	Blanc	3	2	2
<i>Tanacetum vulgare</i>	Tanaïsie commune	7-9	B	Jaune	3	2	2
<i>Teucrium chamaedrys</i>	Germandrée petit-chêne	5-9	B	Rose	3	3	2
<i>Thymus vulgaris</i>	Thym commun	4-9	B	Rose	3	3	1
<i>Blackstonia perfoliata</i>	Chlorette	5-9	N	Jaune	3	2	4
<i>Borago officinalis</i>	Bourrache officinale	4-9	N	Bleu	3	2	2
<i>Campanula glomerata</i>	Campanule agglomérée	6-9	N	Violet	3	2	2
<i>Digitalis lutea</i>	Digitale jaune	6-8	N	Jaune	2	2	3
<i>Helianthemum nummularium</i>	Hélianthème à feuilles arrondies	5-9	N	Jaune	3	2	2
<i>Lamium maculatum</i>	Lamier maculé	4-10	N	Rose	2	2	3
<i>Leucanthemum vulgare</i>	Marguerite commune	5-8	N	Blanc	3	2	3
<i>Linum strictum</i>	Lin raide	5-7	N	Jaune	3	3	1
<i>Melilotus albus</i>	Mélicot blanc	6-9	N	Blanc	3	2	2
<i>Narcissus pseudonarcissus</i>	Jonquille	3-5	N	Jaune	2	2	3
<i>Papaver rhoeas</i>	Coquelicot	5-7	N	Rouge	3	2	3
<i>Prunella laciniata</i>	Brunelle laciniée	6-9	N	Blanc	3	3	2
<i>Saponaria officinalis</i>	Saponaire officinale	6-9	N	Rose	3	2	3
<i>Scabiosa columbaria</i>	Scabieuse colombarie	6-10	N	Rose	3	2	2
<i>Silene dioica</i>	Silène dioïque	5-7	N	Rouge	2	2	3
<i>Verbena officinalis</i>	Verveine officinale	6-10	N	Violet	3	2	3



Callune



Thym commun



Campanule agglomérée



Bourrache officinale



Saponaire officinale



Scabieuse colombarie

Conseils

Les espèces exotiques et les variétés horticoles ne présentent **aucun avantage** pour la biodiversité et peuvent être même considérées comme **nuisibles** pour les pollinisateurs. Autant favoriser, même dans les parterres fleuris, des espèces végétales locales favorables aux insectes pollinisateurs.

Légende

Lumière

1

2

3

Ombre

Mi-ombre

Lumière

Température

1

2

3

Froid

Tempéré

Chaud

Humidité du sol

1

2

3

4

Très sec

Sec

Temporairement humide

Humide

pH du sol

N : Neutre

A : Acide

B : basique

Palette végétale Haute-Garonne 2024 6

Milieu rocailleux



Orpin blanc



Orpin des rochers



Orpin âcre




Cymbalaire des murs



Globulaire commune

		Floraison	pH du sol	Couleur fleur	Lumière	Température	Humidité du sol
Nom latin	Nom vernaculaire						
<i>Cymbalaria muralis</i>	Cymbalaire des murs	5-10	B	Violet	2	2	3
<i>Globularia bisnagarica</i>	Globulaire commune	4-6	B	Violet	3	2	2
<i>Sedum acre</i>	Orpin âcre	5-9	N	Jaune	3	2	1
<i>Sedum album</i>	Orpin blanc	6-9	N	Blanc	3	2	1
<i>Sedum rupestre</i>	Orpin des rochers	6-9	N	Jaune	3	2	1

Légende



Conseils

Ces milieux ne demandent pas spécifiquement d'entretien.

Milieu humide

Strates arborée et arbustive

Nom latin	Nom vernaculaire	Floraison	pH du sol	Couleur fleur	Lumière	Température	Humidité du sol
<i>Alnus glutinosa</i>	Aulne glutineux	2-4	N	Vert	3	2	4
<i>Fraxinus angustifolia</i>	Frêne à feuilles étroites	4-5	N	Marron	3	3	3
<i>Fraxinus excelsior</i>	Frêne commun	4-5	N	Marron	1	2	4
<i>Populus alba</i>	Peuplier blanc	3-4	N	Vert	3	3	4
<i>Populus nigra</i>	Peuplier noir	-	N	Vert	3	2	4
<i>Salix alba</i>	Saule blanc	4-5	N	Jaune	3	2	4
<i>Salix atrocinerea</i>	Saule à feuilles d'Olivier	3-4	N	Vert	3	2	3
<i>Salix caprea</i>	Saule marsault	3-4	N	Vert	3	2	3
<i>Salix purpurea</i>	Saule pourpre	3-4	N	Marron	3	2	4
<i>Salix viminalis</i>	Saule des vanniers	3-4	N	Noir	3	2	4



Frêne commun



Peuplier blanc



Saule blanc



Saule à feuilles d'Olivier




Saule pourpre



Saule des vanniers

Légende



Conseils

La végétation hygrophile s'établit selon un gradient d'humidité, du haut des berges jusqu'à l'eau, selon les espèces. Ce développement est considéré comme très rapide. Les ripisylves permettent le maintien des berges et améliorent la qualité de l'eau.

La végétation herbacée présente au pied de la ripisylve peut être **fauchée une à deux fois** par an pour favoriser la vue.

Milieu humide

Strate herbacée

Nom latin	Nom vernaculaire	Floraison	pH du sol	Couleur fleur	Lumière	Température	Humidité du sol
<i>Agrostis stolonifera</i>	Agrostide stolonifère	6-8	A	Vert	3	2	4
<i>Cirsium palustre</i>	Cirse des marais	7-9	A	Rose	3	2	4
<i>Juncus acutiflorus</i>	Jonc acutiflore	6-8	A	Marron	3	2	4
<i>Juncus effusus</i>	Jonc épars	6-9	A	Vert	3	2	4
<i>Lotus pedunculatus</i>	Lotus des marais	6-9	A	Jaune	3	2	4
<i>Althaea officinalis</i>	Guimauve officinale	6-9	B	Blanc	3	2	4
<i>Epilobium hirsutum</i>	Epilobe hérissé	6-9	B	Rose	3	2	4
<i>Juncus inflexus</i>	Jonc glauque	6-8	B	Vert	3	2	4
<i>Cardamine pratensis</i>	Cardamine des prés	4-6	N	Rose	2	2	3
<i>Carex acutiformis</i>	Laïche des marais	4-6	N	Marron	2	2	4
<i>Carex otrubae</i>	Laïche cuivrée	5-7	N	-	3	2	3
<i>Carex pendula</i>	Laïche à épis pendants	5-7	N	Marron	2	2	4
<i>Deschampsia caespitosa</i>	Canche des champs	6-8	N	Vert	2	2	4
<i>Elytrigia repens</i>	Chiendent rampant	6-9	N	Vert	3	2	3
<i>Eupatorium cannabinum</i>	Chanvre d'eau	7-8	N	Rose	2	2	4
<i>Filipendula ulmaria</i>	Reine des prés	6-8	N	Blanc	3	2	4
<i>Iris pseudacorus</i>	Iris des marais	4-7	N	Jaune	3	2	4
<i>Lychnis flos-cuculi</i>	Œil-de-perdrix	5-8	N	Rose	3	2	4
<i>Lycopus europaeus</i>	Lycopée d'Europe	7-9	N	Blanc	3	2	4
<i>Lythrum salicaria</i>	Salicaire pourpre	6-9	N	Rose	3	2	4
<i>Mentha pulegium</i>	Menthe pouillot	7-10	N	Rose	3	3	4
<i>Mentha suaveolens</i>	Menthe à feuilles rondes	7-9	N	Rose	3	3	4
<i>Molinia caerulea</i>	Molinie bleue	7-10	N	Bleu	2	2	4
<i>Persicaria hydropiper</i>	Renouée poivre d'eau	7-10	N	Rose	2	2	4
<i>Phragmites australis</i>	Roseau commun	8-9	N	Bleu	3	2	4
<i>Succisa pratensis</i>	Succise des prés	1-10	N	Rose	2	2	4
<i>Typha latifolia</i>	M assette australe	6-9	N	-	3	3	4
<i>Valeriana officinalis</i>	Valériane officinale	5-7	N	Rose	3	2	4
<i>Veronica anagallis-aquatica</i>	M ouron aquatique	5-9	N	Bleu	3	2	4
<i>Veronica beccabunga</i>	Véronique des ruisseaux	5-9	N	Bleu	3	2	4



Epilobe hérissée



Jonc épars



Reine des prés



Œil-de-perdrix



Salicaire pourpre



Iris des marais

Conseils

Les prairies humides ont un rôle majeur dans le cycle de l'eau.


Elles servent dans l'épuration de l'eau et la régulation des inondations.

Les **milieux propices à un réensemencement** d'espèces hygrophiles sont les espaces en légères dépressions ou dont le toit de la nappe phréatique est proche du sol.

La flore des milieux humides est **fragile** c'est pourquoi il faut absolument éviter tout enrichissement du milieu (engrais par exemple).

Conserver le plus possible les espaces enherbés plus ou moins régulièrement inondés.

Légende





Bibliographie

Flandin, J., (2019), Plantons local en Île-de-France, ARB îdF, p.102

Ventre V., Bieuzen P., (2023), Plantons local en Occitanie, ARB Occitanie, 156 pages

Syndicat mixte d'études et d'aménagement de la Garonne (2014), Plantations à privilégier en bord de Garonne, 3 pages

